



Datos rápidos

- El implante es un pequeño dispositivo del tamaño de un palillo que se coloca bajo la piel de la parte superior interna del brazo. Solo se tarda 30 segundos en implantarlo y tiene una eficacia del 99.9% en la prevención del embarazo.
- El implante debe sustituirse cada 3 años. Puede elegir que se retire el implante en cualquier momento.
- El implante es un método anticonceptivo que solo contiene progestina. El medicamento que contiene el implante se llama etonogestrel.
- Este medicamento que contiene el implante adelgaza el revestimiento del útero, lo que provoca menos sangrado y cólicos. También impide la ovulación y mejora las afecciones causadas por los cambios mensuales en los niveles hormonales.
- Podrá sentir el implante bajo la piel, pero no debe causarle molestias ni dolor. La gente no podrá notar la presencia del implante.
- El implante puede provocar períodos menstruales irregulares, como ausencia de sangrado o sangrado diferente. Muchas mujeres experimentan este efecto con el implante, y existen medicamentos para detener el sangrado si te molesta.



GINECOLOGÍA PEDIÁTRICA Y DE LA ADOLESCENCIA

El implante

¿Cómo me pongo un implante?

- Una vez que decidas que el implante es la opción adecuada para ti, llama a nuestro consultorio (720-777-2667) o utiliza MyChart para programar una cita.
- En tu visita, el médico revisará tu información médica, responderá tus preguntas y recolectará una muestra de orina.
- Cuando llegue el momento de colocar el implante, apoyarás el brazo sobre la mesa. El médico adormecerá una zona muy pequeña de la cara interna de la parte superior del brazo. A continuación colocará el implante debajo de la piel.
- El médico colocará un trozo pequeño de cinta adhesiva sobre la piel y luego te vendará el brazo.

¿Qué debo hacer tras la colocación del implante?

- Puedes realizar todas tus actividades normales después de que te pongan el implante.
- Quítate la venda del brazo al final del día, pero deja la cinta adhesiva en su sitio.
- Ponte un nuevo vendaje sobre la cinta adhesiva durante los primeros 2 o 3 días.
- Retira la cinta adhesiva entre 5 y 7 días después de la colocación del implante. No pasa nada si se desprende antes.
- Es posible que te salga un moretón en el brazo. Esto es habitual y desaparecerá en un par de semanas.
- Ponte en contacto con nuestra clínica si tienes enrojecimiento, dolor o cualquier duda.

83% de personas con menstruaciones dolorosas (dismenorrea) mejoraron con el implante



77%
resolvieron sus
menstruaciones dolorosas

6%
experimentaron disminución
de la intensidad del dolor


¿Cómo debo llevar ahora el control de mi menstruación?

- Cuando se utiliza el implante, es habitual que se produzcan sangrados irregulares o que no haya sangrado. Es muy probable que el patrón de sangrado sea aleatorio, lo que significa que puede aparecer o desaparecer en cualquier momento.
- Si lo deseas, puedes utilizar una aplicación de seguimiento menstrual o un calendario impreso para marcar los días en los que tengas sangrado.

Si tengo sangrado irregular con el implante, ¿qué puedo hacer al respecto?

- Empieza por llevar el control del sangrado. ¿Cuánto sangras y cuántos días a la semana?
- Los sangrados irregulares con el implante son un efecto secundario normal. Si te molestan, llama al 720-777-2667 o envía un mensaje por MyChart a la clínica y hablaremos de las opciones para tratar el sangrado relacionado con el implante.

Patrón de sangrado durante un período de tres meses cuando se utiliza el implante



¿Cuáles son otros efectos secundarios?

Es posible tener otros efectos secundarios con el implante, pero son mucho menos frecuentes que los cambios en el sangrado menstrual. El implante no provoca aumento de peso, cambios de humor ni acné en la mayoría de las usuarias. No provoca disminución de la densidad ósea ni aumento de los quistes ováricos. Habla con nuestra clínica si tienes dudas sobre estos temas antes o después de ponerte un implante.

¿Qué debo saber cuando utilice el implante como método anticonceptivo?

- El implante tarda 5 días en considerarse un método anticonceptivo eficaz. Sigue utilizando tu método actual durante al menos 5 días después de que te lo coloquen.
- El implante no previene las infecciones de transmisión sexual (ITS). Utiliza preservativos y hazte pruebas al menos una vez al año.

Más información



childrenscolorado.org/Gyn



720-777-2667



Children's Hospital Colorado
Here, it's different.™